

病人

须知


治疗药物

心脏病

抗心律失常药物

Antiarrhythmic Agents

- Sotalol*
- Flecainide Acetate*
- Propafenone*
- Amiodarone*



Medicine To Treat: **Cardiac Diseases**

关于您的药物

您的医生刚开给您一种抗心律失常剂，如 Sotalol、Flecainide、Propafenone 及 Amiodarone。

这组药物是用来治疗什么疾病？

这组药物主要是用来抑制并防止心律失常复发。

我该如何服用这种药物？

请遵照药方标签上的指示，在餐前或餐后以水送服。

如果忘了服用一剂该怎么办？

如果忘了服用一剂，尽可能在 4、6 或 12 小时内服用，视您每天需服 3 次、2 次或 1 次而定。如果分别超过 4、6 或 12 小时，则不要再服用。等到下次服药时间才服用。如果没有医生指示，千万不可连服两剂。

这组药物可能引起什么副作用？

这组药物很少会使现有心律失常现象恶化或引发新的心律失常现象。您可能会感到心跳严重减缓或失常，严重头晕或发昏。

请把所有药物储存在儿童拿不到的地方

药物	可能引起的副作用
Sotalol	<ul style="list-style-type: none"> • 疲倦、头晕、恶心、呕吐及呼吸困难 • 泌尿失常 • 性功能失常 • 背痛、皮疹、出血及视觉失常
Flecainide	<ul style="list-style-type: none"> • 头晕、头痛、疲倦 • 视觉失常 • 恶心 • 皮疹 • 呼吸困难
Propafenone	<ul style="list-style-type: none"> • 便秘、腹泻、腹痛、恶心及呕吐 • 味觉改变 • 头痛、头晕、疲倦、发昏 • 口干 • 视线模糊 • 胸口疼痛、呼吸困难
Amiodarone	<p>能引起数种全身性副作用，因此须定时让医生观察。</p> <p>能损害肺脏功能。早期症状包括劳动型气急、干咳、发热、胸口疼痛、嗜睡及虚弱。</p> <p>能损害肝脏功能。症状包括恶心、呕吐、腹痛、体重减轻、黄疸及腹部肿胀。</p> <p>能损害甲状腺功能。对于甲状腺功能过盛的人，初期症状包括体重减轻、焦虑、震颤及不能耐热。甲状腺功能较低的人则不能耐冷、嗜睡及心率缓慢。</p>

如果发现以上任何症状，请尽早通知医生。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉

我该采取什么防范措施？

因为这组药物能与其它药物产生相互作用，所以亦不宜与传统药物同时服用。当您因其它疾病求诊时，您必须告诉医生您正在服用这组药物。

到目前为止，关于孕妇服用这组药物的资料还是不足够。因此，在怀孕期间除非真正需要才服用这组药物。

这种药物能分泌在乳汁中，对婴孩产生严重的不良影响。因此在服药期间必须停止哺乳。

我该如何储存这种药物？

您应该把这种药物储存在密封的容器里，置于阴凉干燥之处。