

病人

须知

治疗药物

心脏病

抗血小板素

Antiplatelet Agents

- Aspirin
- Dipyridamole
- Thienpyridine



Medicine To Treat: Cardiac Diseases

关于您的药物

您的医生刚配给您以下药物：

| 药物 | 用来治疗什么疾病 | 其他药名 |
|---------------------|------------------------------------|---|
| Aspirin | 减少血液黏性，从而减少中风或心脏病发作机率。 | Cardiprin®, Disprin® |
| Dipyridamole | 减少血液黏性，常与 Aspirin 同时服用，以减少中风机率。 | Persantin® |
| Thienpyridine group | 减少血液黏性。可单独或与 Aspirin 同时服用以预防心脏病发作。 | Ticlopidine (Ticlid®), Clopidogrel (Plavix®) |

我该如何服用这种药物？

您必须在餐后服用这种药物以防腹部不适。在征询医生意见之前不可停服。

有些 Aspirin 可直接以水送服，有些则须咀嚼、吮吸或溶于水后才服用。如果不確定该如何服用，请向您的药剂师查询。

如果忘了服用一剂该怎么办？

如果忘了服用一剂，记起时应立刻服食。如果已接近下一回服药时间，只需照服一剂，不可连服两剂。

这种药物可能引起什么副作用?

| 药物 | 可能引起的副作用 |
|---------------------|---|
| Aspirin | <ul style="list-style-type: none">• 敏感性反应(打喷嚏、呼吸困难、喉咙肿胀、气喘、发痒或皮疹)。• 嘴巴、消化不良或腹部不适。服用Aspirin肠溶制剂或与胃药同时服用能减轻这些症状。• 不寻常出血或瘀血、耳鸣或尿中带血。 |
| Dipyridamole | <ul style="list-style-type: none">• 头晕或头痛• 消化不良及腹部不适• 皮疹 |
| Thienpyridine Group | <ul style="list-style-type: none">• 腹部不适• 腹泻• 皮疹• 白血球或血小板计数偏低。在服用Ticlopidine时,您可能必须定期做血液检查。 |

如果服药后发现不寻常副作用,请尽早向医生查询。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉

我该如何储存这种药物？

如果您已怀孕，正在计划生育或哺乳，请通知您的医生。

在服用任何其它药物、营养补品或草药之前，必须征询医生或药剂师的意见。这是因为有些药物可能会和您的药物产生相互作用。

如果您要接受外科手术，包括牙科手术，请通知医生。您或许需要在手术前停止服药以预防过量出血。

我该如何储存这种药物？

您应该把这种药物储存在原装容器里并加以关紧，置于阴凉干燥之处。



Ministry Of Health

