

医药知识

# 抗生素 ANTIBIOTICS

Azithromycin, Clarithromycin  
Erythromycin



MINISTRY OF HEALTH  
SINGAPORE



SINGHEALTH / PIL / C100R0



## 关于您的药物

Azithromycin、Clarithromycin和Erythromycin是一种抗生素。它可以治疗感染病。

## 我该如何服用这种药物？

Erythromycin最好是空腹服食（饭前一小时或饭后两小时）。如果肠胃不适，您可以在饭后服食此药。如果您的药丸是肠溶片，请整颗吞食。如果您不确定您的药丸是哪一种药丸，请向您的药剂师咨询。

Clarithromycin可以在饭前或饭后服食。

Azithromycin应该在饭后服食。

请勿与胃片一起服食，因为胃片会减低这些药物的药效。若有需要，请在服食胃片前一小时或服食胃片后两小时服用这些药物。

请遵照指示的时间服食药物。尽管您感到身体康复了或状况已好转了，请务必把药物服食完毕。您的病症可能在病菌被消除前好转。

## 如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

## 这种药物可能引起什么副作用？

普遍的副作用包括腹痛、抽筋、噁心和呕吐。偶尔，口腔内可能会长口疮。

服食Clarithromycin可能导致头痛。

如果您感到腹绞痛、腹部压痛、腹泻（严重且稀水的、并有血）、呼吸困难、红疹或脸/嘴唇/颈项/手脚肿胀，请即刻停止服药并向您的医生寻求诊治。

## 我应该注意些什么？

请告知您的医生和药剂师您正服用的草药、辅助品、维他命或其他药物。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

如果您的症状在服药几天后恶化或没有好转，请向您的医生征询意见。

## 我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。