MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE

National Healthcare Group
Adding years of healthy life

NUH
National University Hospital
A member of the NUHS

Alexandra Health

EASTERN HEALTH ALLIANCE

Jurong Health

SingHealth

SINGHEALTH / PIL / C106R0

医药知识

尿失禁药
INCONTINENCE MEDICATIONS

Flavoxate, Oxybutynin
Tolterodine

关于您的药物

Flavoxate，Oxybutynin和Tolterodine是控制频尿或尿失禁的药物。Flavoxate可舒缓因导尿引起的膀胱紧缩。

我该如何服用这种药物?

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

如果我忘了服药，应该怎么办?

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

这种药物可能引起什么副作用?

这种药较普遍的副作用包括口干、便秘、噁心、呕吐、视线模糊、嗜睡和昏眩。

如您感到口干，您可含冰块或糖果。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

我该注意些什么?

请告知您的医生和药剂师您患有的其他疾病如心脏衰竭、青光眼和溃疡性结肠炎。

请告知您的医生和药剂师您正服用的其他药物、草药、辅助品或维他命。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

这些药物可能影响您的警觉性和导致视力模糊，服药后请勿驾驶或操纵机械。避免服食酒精或其他影响警觉性的药物。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何储存这种药物?

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。