

IPRATROPIUM BROMIDE



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



关于您的药物

Ipratropium Bromide有定量喷雾剂和喷雾治疗溶液。

Ipratropium是属于一种抗胆碱药物（Anti-Cholinergics）。它可扩张支气管以让空气更顺畅地进出肺部。

Ipratropium可以医治慢性阻塞性肺部疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease又称COPD）如支气管炎（Bronchitis）和肺气肿（Emphysema）。依据您的病况，它也可加上沙丁胺醇（Salbutamol）喷雾剂用以医治您的哮喘病。

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服用药物。

定量喷雾剂

这种喷雾剂通常需每日使用三至四次，每次使用两剂喷雾。请勿使用超过医生指示的药量。如果您需使用超过一剂喷雾，请等一分钟后再用第二剂喷雾。请记住每个新的喷雾剂需要启动后才可使用（启动即是按两下喷雾剂直至有喷雾喷出）。

喷雾治疗溶液

雾化器利用氧气或压缩空气经由一个细小管子喷出时所产生的负压，将喷雾治疗溶液打成细小颗粒，再经由面罩吸入肺部。Ipratropium可独自使用或加上Salbutamol喷雾液一起使用。它可以每日使用三至四次或持续使用，依据您的状况而定。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

以下的副作用可能出现：

消化系统：噁心、肠胃不适

呼吸系统：咳嗽

心血管：心悸（心跳加速）

神经系统：昏眩、疲惫、头痛、紧张

这些副作用通常是短暂性的。如果您感到这些症状持续或恶化，请告知您的医生。

我应该注意些什么？

请勿让喷雾溶液或其雾水进入眼睛，因为这会造成青光眼（眼内压上升）和其他眼疾。

请告知您的医生和药剂师：

- 您是否患有其他疾病，如青光眼、尿滞留、良性前列腺肥大症（Benign Prostate Hypertrophy）或囊状纤维化（Cystic Fibrosis）。
- 您是否正服用着其他药物、草药、辅助品或维他命。
- 您是否对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。有些病患可能会对喷雾剂中的防腐剂（Benzalkonium Chloride）或稳定剂（Ethylene Diamine Tetra-Acetic Acid又称EDTA）过敏。
- 您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。