

# LEVODOPA PREPARATIONS



MINISTRY OF HEALTH  
SINGAPORE



## 关于您的药物

Levodopa有两种配方，就是加入Benserazide或Carbidopa的配方。这些药物可以控制帕金森病情。它们可改善患者肌肉的活动性和减低肌肉的僵直程度。

## 我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

Levodopa通常以低剂量开始，然后慢慢根据病情的控制调高药量至最适合的份量。请遵守服药的时间以确保最佳的药效。LEVODOPA最好是空腹服食。然而，如果您感到肠胃不适，可在饭后服食。

### 特别指示：

即溶片（Dispersible）药丸会在水中自动散开。加水后搅匀，并在半小时内喝下。

缓释片应整颗吞食，勿咀嚼或拧碎。

有些病患需服药数周后方才见效。不要因为未见效果而停止服食药物。

请记住您正服食的药名、药丸类别和剂量因为当药量更改时您可能感到困惑。

## 如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双倍药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

请将药物保存于远离孩童的地方  
请将过期或不再服用的药物丢弃

## 这种药物可能引起什么副作用？

### 此药物的副作用有：

**消化系统：**噁心、呕吐、食欲不振、味觉失调、口水外流、咽食难下

**心血管系统：**低血压（导致坐起或站起时感到昏眩、头晕或昏厥）、心率失调

**中枢神经系统：**烦躁、焦虑、困惑、发恶梦、幻觉、情绪化

**神经肌肉和骨骼：**手颤抖、行动笨拙或不稳、迟发性异动症（如脸、舌头、手臂、手掌、头或身体有不寻常的动作）、异常的疲惫、虚脱或麻痹

**眼睛：**视力模糊

**其他：**汗水、尿液或口水变得深色、难以排尿

## 我应该注意些什么？

请告知您的医生和药剂师您正服用的其他药物、草药、辅助品或维他命。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

这种药物可能会导致嗜睡或视力模糊，服药后请勿驾驶或操纵机械。若您从躺着或坐着的姿势站起时感到昏眩或头晕，请慢慢起身。

切勿急于恢复日常活动以免跌伤。开始服食药物后，您的身体需要慢慢调整平衡感和调和动作。因此，勿操之过急。

切勿突然停止服食这些药物。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

## 我应该如何在储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。