

METRONIDAZOLE TINIDAZOLE



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



关于您的药物

Metronidazole和Tinidazole是一种治疗感染病的抗生素。含有Metronidazole的药品有口服药丸、静脉注射剂和附加Nystatin的阴道栓剂。含有Tinidazole的药品则只有口服药丸而已。

我该如何服用这种药物？

口服药丸：

- 如果空腹服药令您感到肠胃不适，您可在饭后服食。如果这些症状持续，请向您的医生征询意见。
- 尽管您感到身体康复了或状况已好转了，请必须把药物服食完毕。
- 请依照吩咐的时间服食药物。

Metronidazole/Nystatin阴道栓剂（Vaginal Pessary）：

- 把阴道栓剂沾湿后置入插管末端。
- 放轻松躺卧在床，双脚弯曲用脚板撑着。
- 将插管慢慢置入阴道中，直到您开始感到不适。
- 慢慢按下推杆直至停止。
- 慢慢将插管拿出。阴道栓剂将留在阴道中。
- 将插管清洗干净。把推杆和插管分开，然后用温水和肥皂洗净。
- 用清水冲洗干净。待干后，置回推杆收入盒中。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

您可能感到恶心、呕吐、腹泻、食欲不振、口干、口水有金属味或味觉失调。含着冰块或糖果可暂时减少口干的症状。

同时饮用含酒精的饮料会导致腹痛、恶心、呕吐或脸部潮红。

您可能会感到昏眩或头晕。如果您的警觉性受到影响，服药后请勿驾驶或操纵机械。

我应该注意些什么？

口服药丸：

如果您的病症在服药几天后没有好转或恶化，请向您的医生征询意见。

请勿在疗程中至疗程完毕后三天内饮食任何含有酒精的食物或饮料。

如果您服食抗凝血药如华法林（Warfarin），请告知您的医生。一起服食这些药物可能增加流血的机率。

阴道栓剂（Vaginal Pessary）：

使用阴道栓剂时，您需要使用护垫或卫生棉以免药物流出沾污您的贴身衣物。请勿使用卫生棒因为它会吸收药物减低药效。最好穿用棉质内裤，弃用塑料内裤。

请告知您的医生和药剂师您正服用的其他药物、草药、辅助品或维他命。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。