

医药知识

# 二丙磺胺苯甲酸 PROBENECID



MINISTRY OF HEALTH  
SINGAPORE



SINGHEALTH / PIL / C121R0



## 关于您的药物

Probenecid是一种促尿酸排泄剂。它可以治疗因尿酸过高引起的痛风及痛风性关节炎。它也帮助增高某些抗生素在血中的浓度。

## 我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

虽然您的状况仍未改善或您正服食着其他抗尿酸药，请继续服食此药。它可以加快您的复原或减轻您的痛楚，但通常需要几个星期至几个月。

除非您的医生另有吩咐，请每日喝十至十二杯水。

请在饭后或和牛奶、胃片一起服食此药以避免肠胃不适。

## 如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

## 这种药物可能引起什么副作用？

如果以下的副作用出现，请告知您的医生：

- 心跳加速或心律不整
- 红疹、奇痒或荨麻疹
- 心绞痛，持续超过十五分钟
- 毫无缘由的发烧或喉咙痛
- 哮喘或呼吸困难
- 尿中有血或排尿时疼痛
- 眼睛周围或眼皮肿胀

请将药物保存于远离孩童的地方  
请将过期或不再服用的药物丢弃

如果以下较轻微的副作用出现，请向您的医生咨询：

- 头痛或昏眩
- 噁心或呕吐
- 食欲不振
- 脸部潮红

## 我应该注意些什么？

如果您正接受癌症治疗、患有血液疾病、肾病或胃病，请告知您的医生。

如果您患有糖尿病，这种药会使尿液检验呈假阳性反应。

请告知医生您正服用的其他药物、草药、辅助品或维他命。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

## 我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。

