# **PYRIDOSTIGMINE**



















### 关于您的药物

这种药可以控制重症肌无力(Myasthenia Gravis)的症状,即肌肉虚弱无力。它只能控制病症,并无法治癒这种疾病。

# 我该如何服用这种药物?

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

#### 当您开始服食此药时,您的医生会要求您每日记录:

- 您服药的时间。
- 您感到症状好转的时间(从几点钟到几点钟)。
- 您感到症状持续或恶化的时间(从几点钟到几点钟)。
- 您经历的任何副作用。

这些记录可帮助医生调整您的药量已达到最佳的效果。

饭后服药可减少副作用。

### 如果我忘了服药,应该怎么办?

如果您忘记服药,请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间,应舍弃此次药物,恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次,请征询您医生的意见。

## 这种药物可能引起什么副作用?

这种药可能导致您的视力模糊、肠胃不适、腹泻、头痛、冒汗、潮红、 肌肉抽搐、眼泪或口水的分泌增加。这些副作用通常会随着身体的调整 而减轻或消失。如果这些症状持续或恶化,请告知您的医生。

如果您感到心率失常、昏厥、皮肤出现红疹、脱发、严重腹泻、肌肉虚脱、呼吸困难、咽食难下、尿滞留(尿液无法排出)、说话结巴或困惑,请告知您的医生。

### 我该注意些什么?

请告知您的医生和药剂师您正服用的其他药物、草药、辅助品或维他命。

如果您对任何药物过敏或服药期间产生敏感症状,请告知您的医生。敏感症状有:脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

这种药可能导致您的视力模糊、昏眩或嗜睡。因此,服药后请勿驾驶或操纵机械。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

# 我应该如何储存这种药物?

药物应储存在阴凉及干燥的地方,避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示,一般无需存放在雪柜内。

