

医药知识

乙烯苯磺酸钠

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



SINGHEALTH / PIL / C127R0



关于您的药物

Sodium Polystyrene Sulfonate可降低血液中的钾。它只能帮助控制血液中过高的钾浓度，并不能根除这个问题。

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。若有疑问，请向您的药剂师询问正确的服用方法。

Sodium Polystyrene Sulfonate有两种剂型，口服药水和灌肠剂。这种药可每日服用两至三次，或依照您医生的指示服用。服用前必须把口服药水摇均匀。您必须依照医生的指示服药，不可擅自更改药量或服药的次数。

尽管您感到身体康复了或状况已好转了，请必须把药物服完。未得到医生的允许前，请勿擅自停止服用此药。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

这种药物可能引起什么副作用？

尽管这种药的副作用并不普遍，但还是可能发生的。如果以下的副作用持续或恶化，请告知您的医生：

- 便秘
- 腹泻
- 肚痛
- 噁心
- 呕吐

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

如果以下的副作用发生，请即刻告知您的医生：

- 困惑
- 肌肉无力
- 不寻常的肿胀
- 心率失常
- 肛门或下腹疼痛
- 经常口渴

我应该注意些什么？

在开始服用这种药前，请告知您的医生或药剂师您是否对Sodium Polystyrene Sulfonate或其他药物过敏。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知医生和药剂师您正服用的草药、辅助品、维他命或其他药物，如胃片、毛地黄（Digoxin）、利尿剂（Diuretics）和泻药。

在未开始服用此药前，请告知您的医生您是否患有心脏病、肾病、高血压或便秘。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。如果您在疗程中怀孕，请向您的医生咨询。

如果您的日常饮食需要限制钠盐的摄取，请告知您的医生。

特别饮食指示

未服用任何含有钾的代盐之前，请向您的医生征询意见。如果您的医生告诫您需保持低钠或低盐的饮食习惯，请遵守吩咐。

我应该如何在储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。