MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE

National Healthcare Group
Adding years of healthy life

NUH
National University Hospital
A member of the NUHS

Alexandra Health

EASTERN HEALTH ALLIANCE

Jurong Health

SingHealth

SINGHEALTH / PIL / C131R0

医药知识

傅明酸
TRANEXAMIC ACID

关于您的药物

Tranexamic Acid是一种止血药。它可防止血块溶解。因此，它可预防各种外伤或手术导致的大量出血。

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

Tranexamic Acid有口服药丸、药水和静脉注射剂。通常，每日使用两至三次。

Tranexamic Acid也可在牙科手术后当漱口水使用以制止流血。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

这种药物可能引起什么副作用？

这种药的副作用包括腹泻、头痛、噁心、昏眩、头晕和鼻塞。这些症状通常都是轻微并短暂的。若症状持续恶化，请向您的医生征询意见。

如果以下的症状出现，请即刻告知您的医生：

- 视力出现变化如模糊或辨色能力有异
- 无法排尿

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

我该注意些什么？

如果您患有任何肾病或眼疾，您的医生可能需要调整您的药量。因此，请告知医生您的其他病况。

请告知您的医生和药剂师您正服用的草药、辅助品、维他命或其他药物。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。