

EAR PREPARATIONS

Antibacterial Eardrops 抗生素耳药水
Antibacterial & Anti-Inflammatory Eardrops 抗菌消炎耳药水



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



关于您的药物

这种耳药水含有抗生素以治疗耳道中的细菌感染。有些耳药水也含有类固醇以舒缓耳道中的红肿、刺痛和其他不适。

我该如何服用这种药物？

- 双手清洗干净。躺下或把头向旁倾斜，受感染的耳朵朝上。
- 成人应把耳朵向上和向后拉（儿童则向下和向后）以拉直耳道。
- 滴入医生指示的药量。为保持清洁，请勿让耳药水的开口处触碰到耳朵或其他表面。
- 保持倾斜的姿势数分钟以确保药物充分地渗透和被吸收（或使用棉塞以防药水漏出）。

尽管您感到您的状况已好转了，您也必须完成整个疗程。请勿擅自加长、缩短或更改疗程。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记使用药物，请在记得时马上使用。如果已接近下一次的用药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的用药时间。千万不可使用双份药量。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

请告知您的医生：

- 如果您在使用药水后感到耳朵痒、红或肿。
- 如果您的耳朵内感到灼热或刺痛。

如果您发现在用药后出现任何症状。

我应该注意些什么？

请告知您的医生：

- 您是否对此药或药水中的添加剂或其他化学成份，如防腐剂或色素过敏。
- 如果您没有耳鼓或您的耳鼓破裂。
- 您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。
- 如果您的耳疾在五至七天后恶化或没有好转。

我应该如何储存这种药物？

药物应关紧后储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。启用四个星期后须丢弃。

