

医药知识

阿士匹林 ASPIRIN



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



SINGHEALTH / PIL / C82R0



关于您的药物

ASPIRIN可医治疼痛、发烧、关节炎和其他发炎症状。它也可以降低心脏病发的机率。

在还没服用此药物前，请告知您的医生以下事项：

- 您是否对阿士匹林或其他非类固醇消炎止痛药（如Ibuprofen、Naproxen、Mefenamic Acid、Diclofenac）过敏。
- 您是否怀孕或哺育婴儿（服食Aspirin可能影响生产过程）。
- 如果您服食其他相关药物，如非类固醇消炎止痛药和抗凝血剂（如华法林Warfarin）。
- 如果您患有其他疾病如：
 - 盲肠炎
 - 血凝结或血小板病
 - 肠胃病，如胃溃疡

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量，请依照医生的指示服食药物。

药丸（普通，咀嚼性）：

- 和食物、牛奶或白开水一起服食药丸。
- 药丸须在饭后咀嚼或整颗吞食。
- 药水可以依据指示用来漱口。

药丸（缓释片，肠溶片）：

- 整颗吞食，不可切半或捣碎
- 饭后饮水服食药丸

药丸（即溶片）：

- 把药丸溶于一杯饮食水中，饭后饮用。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

如果以下的副作用出现，请即刻告知您的医生：

- 严重胃痛
- 呕吐有血或咖啡色状物体
- 粪便或尿液有血
- 皮肤出现红疹或荨麻疹并奇痒
- 面颊或眼睛肿胀
- 呼吸困难
- 嗜睡或昏眩
- 耳鸣

如果以下较轻微的副作用出现，请告知您的医生：

- 肠胃不适
- 心灼热

我应该注意些什么？

除非依照医生的指示，请勿在任何手术前五至七天内服食Aspirin。

如果您的Aspirin是用以抗凝血，请在未服食任何止痛药前征询您医生的意见。

如果您须长期服食Aspirin或高剂量的Aspirin，请遵守复诊日期以确保达到预期的效果。服药期间，须停止饮酒以避免肠胃不适。

糖尿病患者备注： Aspirin可能会导致尿液糖检呈假阳性。

如果您正服用其他药物、草药、营养辅助品或维他命，请告诉您的医生或药剂师。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何在储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。