

BETA-LACTAM ANTIBIOTICS

Amoxicillin, Penicillin V
Co-Amoxiclav, Ampicillin/Sulbactam
Cloxacillin, Cefuroxime
Cephalexin



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



关于您的药物

Beta-Lactam 抗生素可以治疗呼吸系统感染、尿道炎、食道炎、皮肤感染、胆道感染、骨髓炎、盆骨炎、淋病、幽门螺旋杆菌感染。这种药也可预防高风险性病人因手术引起的败血病和心内膜炎。

我该如何服用这种药物？

这一类抗生素通常是饭后服食。

尽管您感到身体康复了或状况已好转了，请继续把药物服食完毕。如果没有把疗程服完，感染可能会复发或导致细菌对抗生素产生抗性。若敏感症状出现，如皮肤出红疹、眼睛肿胀或呼吸困难，请即刻停止服食这种药并马上寻求医治。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

最常见的副作用有噁心、呕吐、胃痛和腹泻。如果出现敏感症状，如皮肤出现红疹或痒、脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、发烧、颤抖、手脚麻痹或刺痛，请即刻告知您的医生。

我应该注意些什么？

如果您对PENICILLIN或任何药物过敏，请告诉您的医生。

我应该如何储存这种药物？

请保存在清凉干爽的地方。避免曝晒于太阳或搁置在温热潮湿的地方。

