

DIPYRIDAMOLE



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



关于您的药物

Dipyridamole是一种抗凝血药。它可预防因血块凝结而阻塞的血管。植入人工心脏瓣膜的病患需服用它以减低血块凝结的风险。

您的医生也可能用它来医治其他心脏或血液疾病。

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

若有疑问，请向您的药剂师询问正确的服食方法。

这种药需定时服食以确保足够的血浓度来达到抗凝血的效果。

请在饭前半至一个小时服食Dipyridamole以确保最佳的吸收。您可以在饭后服食以减低肠胃不适。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

这种药物可能引起什么副作用？

如您有以下副作用，请即刻告知您的医生：

- 心绞痛（持续超过十五分钟）
- 红疹、奇痒或荨麻疹
- 皮肤或眼白发黄

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

如果以下较轻微的副作用出现，请向您的医生咨询：

- 昏眩、头晕或头痛
- 噁心、呕吐或胃痛
- 脸部潮红

我应该注意些什么？

医生可能同时使用Dipyridamole和其他抗凝血药或Aspirin以达到最佳的抗血凝效果。这同时也增加流血的风险。因此，除非是医生的指示，千万不可私自服食ASPIRIN。

告知您的医生或牙医您正服食Dipyridamole、其他抗血凝药或Aspirin。

如果您也正服食Aspirin，您必须定时复诊以确定疗程的进展。

当您从躺着或坐着的姿势站起时，请减缓起身速度。快速起身会令您感到头晕。

请告知您的医生您正服用的草药、辅助品、维他命或其他药物。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何在何处储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。