

若您出现下列症状, 请立刻停止服药并打电话和您的医生联络:

- 皮疹或荨麻疹
- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难
- 精神混乱
- 不寻常的出血或淤血
- 皮肤或眼白变黄

我应该注意些什么?

在服用这种药物以前,

- 如果您对任何药物有过敏反应, 请通知您的医生或药剂师。
- 如果您目前正在服用其他药物, 请通知您的医生或药剂师。
- 如果您患有或曾经患有肝脏或肾脏疾病, 请通知您的医生。
- 如果您正在怀孕, 或计划生育, 或正在哺乳, 请通知您的医生。
- 避免抽烟或饮用酒精, 因为这两者能导致您的胃分泌更多的胃酸, 而且也会影响药物的效力。
- 若您同时服用抗酸药, 请与此药分开 1 至 2 个小时服用。


我应该如何储存这种药物?

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方, 并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



Histamine₂-Receptor Antagonists

Cimetidine • Famotidine • Ranitidine

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

这类药物能抑制胃酸的分泌。它通常用来防治胃溃疡和其他因胃酸分泌过多所引起的疾病。它也可以用来治疗胃灼热和消化不良。

这种药物也可用于其他病症。请向您的医生或药剂师询问更多详情。

我该如何服用这种药物？

这是一种口服药物，可在饭前或饭后服用。请务必按照药物标签上的指示服药。若有不明白之处，请向医生或药剂师查询。

除非经医生指示，否则您不应该连续服用这种药物超过两个星期。如果在完成一段疗程后症状仍然持续或复发，请向医生或药剂师查询。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用？

虽然这种药物的副作用非常罕见，但仍可能发生，然而这些副作用有可能在治疗过程中因身体逐渐适应药物而消失。但如果以下副作用持续或引起不适，请向医生查询。

药物	副作用
Cimetidine (Tagamet®)	头痛
Famotidine (Pepcid®)	腹泻
Ranatidine (Zantac®)	头晕 便秘

若您在服药期间出现任何不寻常的副作用，请向医生查询。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方