

我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在密封容器里，并避免高温及阳光直接照射。



Ministry of Health



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



Tamoxifen

C61R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

Tamoxifen能抑制雌激素的作用，从而抑制因雌激素刺激而生长的乳癌细胞。它用于治疗初期和末期乳癌。

我该如何服用这种药物？

这是一种口服药物，可在饭前或饭后服用。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用？

- 潮红（暂时性）
- 皮疹
- 在服药后的第一个星期，骨或肿瘤的疼痛可能加剧
- 轻微恶心及呕吐

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

- 阴道干燥
- 月经失调或停止
- 对光线产生敏感：避免过度曝晒在阳光下并以衣物蔽体或使用防晒油
- 脚部深部静脉血凝块形成
- 增加患上子宫癌的机率
- 视线受到干扰

我应该注意些什么？

如有以下症状，请立即与医生联络：

- 不寻常或过量的阴道出血
- 骨盆疼痛
- 视觉产生变化，例如：视线模糊
- 脚部疼痛或肿胀、胸痛或气喘

在治疗初期加剧的骨或肿瘤痛将在几天后减缓；请勿在未征询医生的指示前停止服用药物。

潮红的症状也会随着时间减退，否则请通知您的医生。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方