

## MEDICATION INFORMATION LEAFLET

### [Oxcarbazepine]

#### 1) 此药有什么用途?

Oxcarbazepine 用于控制癫痫或惊风发作。

#### 2) 如何服用此药?

请遵守标签上的指示按时规律地服用药。药物可与食物一起服用，以减少肠胃不适。

药物可长达几个星期才见最大效益，服药后不一定马上见效。

在病情控制的情况下也请务必按时规律地服用药

擅自停止服用此药可能会导致惊风症状不受控制

在未经医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。

#### 3) 忘记或漏服药该怎么办?

如果忘记服药，记起来的时候立即补服药物。若已接近下次服药的时间，便无须补服，请依照下次服药的时间服药便可。请勿因为忘记服药而连续服用两剂或自行增加剂量。

.

#### 4) 服用此药需要注意什么/有任何预防?

在开始服药前，若孩子有以下病情, 请告知医生:

- 肝脏疾病
- 肾脏疾病
- 心脏疾病
- 血液相关疾病
- 对 oxcarbazepine 或 carbamazepine 敏感

女性患者: 若现在怀孕, 打算怀孕或者在喂母乳, 请告知医生

若服用此药物导致惊风加重或有变化, 请立即告知医生

#### Disclaimers

If you take more than the recommended dose, please seek medical advice immediately. The information provided on this page does not replace information from your healthcare professional. Please consult your healthcare professional for more information.

### **史蒂芬斯-强森症候群**

一些药物可导致史蒂芬斯-强森症候群。这是一种罕见但致命性的皮肤水疱疾病。

它的主要特征包括全身皮肤红疹，口腔多处破皮，水疱状的皮肤疹，发烧，搔痒及其它的症状。这种症状通常是发生在治疗期间的前几个月（特别是在前 3 个月的治疗必需密切观察）。

若服用此药物超过 3 个月以上又没有上述的皮肤反应，得到此症候群的机率是低的。

因为这种症状的病情会迅速恶化，一旦病患有出现皮肤的初期症状时，家长请务必马上送病患去医院的急诊部门。

### **5) 此药会引起什么常见副作用？**

所有药物都有可能引起一些副作用，因人而异。

若以下副作用在几天后仍没有消失，很严重或影响孩子的日常生活，请告知医生。

常见的副作用通常会在孩子刚开始服药时出现。这包括：

- 头晕，行动不稳定
  - 较缓慢得从坐着或躺下转换姿势
- 嗜睡
  - 避免驾驶，操作机械或从事剧烈的活动
  - 若服用其他药物要特别小心； 伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用
- 腹泻或便秘
  - 多喝水
  - 若便秘，多服用高纤维的食品和多做运动
- 恶心、呕吐、肚痛、食欲不振
  - 若服用药物后有恶心、呕吐的症状，药物可与食物一起服用。
  - 避免重口味，辛辣或有浓重气味的食物
- 头疼，背或肌肉疼痛
  - 可服用 paracetamol 来舒缓疼痛

### **6) 此药会引起什么罕见但严重副作用，需要立即告知医生？**

若对药物过敏，症状包括以下。请立即到急诊部求医。

#### **Disclaimers**

If you take more than the recommended dose, please seek medical advice immediately. The information provided on this page does not replace information from your healthcare professional. Please consult your healthcare professional for more information.

- 眼睛，面部，嘴唇或舌头肿胀
- 呼吸困难
- 全身皮肤起红疹发痒

若以下的严重的副作用出现，请立即到急诊部求医：

- 迅速扩散的皮肤红疹，可能起水疱或皮肤脱落
- 持续恶心、呕吐、思绪混乱、疲惫
- 持续发烧，喉咙痛，口疮
- 淤血，或不寻常的出血，病情迅速恶化
- 皮肤或眼睛泛黄（黄疸），深色尿液或浅色粪便，严重食欲不振，胃痛，持续恶心或呕吐
- 思绪混乱或异常的思想

## 7) 服用此药时需要避免服用任何药或食物？

请告知你的医生或药剂师你正在服用此药。Oxcarbazepine 可能降低口服避孕药的效力。如果在服用此药时需要避孕计划，请与医生商量。

若在服用此药，请勿服用酒精。

在服用其他药物之前请请教你的医生或药剂师。这包括任何在外买的药物，保健品和中草药产品。

## 8) 如何储存此药？

存放在阴凉干燥处，避免阳光直射，远离儿童。

## 9) 如何安全弃置此药？

把药物密封进黑色垃圾袋后扔进垃圾槽。



Version 1

Last Review: 29/07/2020

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

**PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®**

### Disclaimers

If you take more than the recommended dose, please seek medical advice immediately. The information provided on this page does not replace information from your healthcare professional. Please consult your healthcare professional for more information.