

我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 如果您对这种药物或其他药物有过敏反应，请通知您的医生。
- 如果您正在服用其他药物，请通知您的医生。
- 如果您患有其他疾病，例如：血压问题、心脏问题（尤其是心跳不规则）、帕金森症、骨髓问题、排尿困难或前列腺肿大、青光眼、有乳癌前科、有癫痫前科或有肾脏或肝脏问题，请通知您的医生。
- 如果您已经怀孕或计划生育或正值哺乳期间，请通知您的医生。

在服药期间请避免过度曝晒于强烈的太阳光底下，并在出外时使用防晒油。

若您在服药后出现下列症状，请立即向医生求诊：

- 发高烧、肌肉僵硬并大量出汗；或
- 心跳不规则；或
- 癫痫发作

我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



治疗精神病的药物 Medicine To Treat Mental Disorders

Chlorpromazine • Flupenthixol • Pimozide • Sulpiride
• Haloperidol • Trifluoperazine

C35R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

您的医生开给您的是一种治疗精神病的药物。

除了精神病，这些药物还有其它用途（例如：Chlorpromazine 可治严重恶心呕吐，而 Haloperidol 则可控制打嗝）。

这类药物可减少大脑内某些神经传递物质的传导作用，进而达到镇静、安定作用以及控制精神病症状，例如：思维混乱、幻觉、妄想、情绪冷漠、缺乏动力等等。

我该如何服用这种药物？

您的医生将会指示您服药的分量及次数。在服药初期医生可能会多次调整您的药物剂量以确定最适合您的剂量。请勿服用过量或过于频密。

请在每天同一个时间服药。您可和食物一起服用以避免胃不舒服。请勿在征询医生的意见之前擅自停止服药。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

1、肌肉不自主运动

这类药物可造成肌肉抽搐、颤抖、脸部或肢体的肌肉抽搐，或舌头、脸部及颞部肌肉不自主运动。您的医生可能会开给您一种称为 benzhexol 的药物来控制以上症状。若您有以上任何一种肌肉不自主运动的症状，请通知您的医生。

2、嗜睡及晕眩

这类药物会令您觉得昏昏欲睡及头晕。请小心驾驶汽车或操作器械。避免饮用酒精。

3、其他副作用

这类药物可能引起其他副作用，例如：视力模糊、便秘、口干、乳房疼痛或肿胀。若您有以上副作用请通知医生。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方