

我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 如果您对这类药物或其他药物有过敏反应，请通知您的医生。
- 如果您正在服用其他药物，请通知您的医生。
- 如果您患有其他疾病，例如：高血压、心脏问题（尤其是心跳不规则）、帕金森症、排尿困难或前列腺肿大、青光眼、有乳癌前科、有癫痫前科或有肾脏或肝脏问题，请通知您的医生。
- 如果您已经怀孕或计划生育或正值哺乳期间，请通知您的医生。

在服药期间请避免直接及过度曝晒于强烈的阳光底下；出外时请使用防晒油。

若您在服药后出现下列症状，请立即向医生求诊：

- 发高烧、肌肉僵硬伴随大量出汗；
- 心跳不规则；
- 癫痫发作；

我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



治疗精神病的药物

Medicine To Treat Mental Disorders

Risperidone • Olanzapine • Quetiapine

C26R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

您的医生开给您一种治疗精神病的药物。

这种药可减少大脑内某些神经传递物质的传导作用，从而帮助控制精神病症状，例如：情绪冷漠、缺乏动力、思维混乱、幻觉、妄想等等。

我该如何服用这种药物？

您的医生将会指示您服药的分量及次数。在服药初期医生可能需要调整您的服药剂量好几次以确定最适合您的剂量。请勿服用过量或过于频密。

这类药物可在饭前或饭后服用。请勿在征询医生的意见之前擅自停止服药。

若您服用的是液体剂型的 risperidone，请使用厂商所提供的滴管准确地抽取所需要的剂量。您可以将药水掺入开水、低脂奶、咖啡或橙汁内，但勿掺入可乐或茶中。请把药物在掺入其它饮料后的 4 个小时内喝完。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

1、肌肉不自主运动

这类药物可造成肌肉抽搐、震颤、脸部或肢体的肌肉抽搐，或舌头、脸部及颞部肌肉的不自主地运动。若您有任何肌肉不自主运动的症状，请通知您的医生。

2、嗜睡及晕眩

这类药物会令您觉得昏昏欲睡及头晕。若您需驾驶汽车或操作器械，请格外小心。切忌摄取酒精。

3、其他副作用

这类药物可能引起其他副作用，例如：视力模糊、便秘及口干。若您有以上副作用请通知医生。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方