

# 病人

须知

治疗药物

## 心脏病

降血脂药

*Lipid-Lowering Medicines*

- Statins**
- Fibrates**
- Fat Binding Agents**
- Nicotinic Acid Group**



Medicine To Treat: Cardiac Diseases

# 关于这种药物

您的医生刚配给您以下药物

药物组别	组别中药物例子
Statins	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lovastatin</li><li>➤ Pravastatin (Pravachol®)</li><li>➤ Simvastatin (Zocor®)</li><li>➤ Atorvastatin (Lipitor®)</li><li>➤ Fluvastatin (Lescol®)</li></ul>
Fibrates	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Gemfibrozil (Lopid®)</li><li>➤ Bezafibrate (Bezalip®, Bezalip Retard®)</li><li>➤ Ciprofibrate (Modalim®)</li><li>➤ Clofibrate (Atromid-S®)</li><li>➤ Fenofibrate (Lipanthyl®, Lipanthyl Supra®)</li></ul>
Fat Binding Agents	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cholestyramine (Questran Light®)</li></ul>
Nicotinic Acid Group	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Nicotinic Acid</li><li>➤ Acipimox (Olbetam®)</li></ul>

## 降血脂药是用来治疗什么疾病?

这组药物有助于减低血液中的胆固醇，减低心脏病发作与中风的机率以及减少以手术改善心脏血液循环的需要，如气囊血管成形术(Balloon Angioplasty)或心脏绕道手术。医生将根据您的健康状况及脂质水平来决定何时开始为您进行治疗。

请把所有药物储存在儿童拿不到的地方

这种药物透过减低‘坏胆固醇’(低密度脂蛋白或LDL胆固醇)及‘脂肪’(三酸甘油酯)来降低您血液中的胆固醇水平，同时提高‘好胆固醇’(高密度脂蛋白或HDL胆固醇)的水平。过高的胆固醇水平能逐渐阻塞为心肌提供血液的血管，从而导致冠状心脏病。这个过程，叫做动脉硬化，最终能导致胸口痛(心绞痛)、心脏病发作或中风。此外，这种药物也有助于延长病患者的寿命。

## 如何服用这种药物？

除了Cholestyramine以外，这组药物都是片装或胶囊装。请遵照药方标签上的指示以清水送服。Statins最好在晚餐后服用。

Fat Binding Agents是粉状包装。请遵照药方标签上的指示以水服用。其他药物须在服用这药的1小时前或4小时后服用。这是为了避免影响其他药物的吸收。

没有医生的指示，不要停止服用。因为一旦您停止服用，您的胆固醇水平可能再度升高。您所服用的其他药物剂量可能也需要随着调整。

## 如果忘了服用一剂该怎么办？

如果忘了服用一剂，只须在下次服药时照平时剂量服用。

## 这种药物可能引起什么副作用？

服用这组药物的一般反应概列在以下表中。这组药物极少会造成肝脏机能失调。您的医生将密切检查您的身体状况。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉

药物组别	副作用
Statins	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 肠胃不适, 如腹痛、便秘、腹泻</li> <li>• 疲倦</li> <li>• 头痛、肌肉酸痛</li> </ul>
Fibrates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 呕心、呕吐</li> <li>• 肠胃不适, 如胃灼热、腹泻</li> <li>• 皮疹</li> <li>• 头痛、肌肉酸痛</li> </ul>
Fat Binding Agents	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 肠胃不适, 如便秘、腹泻</li> <li>• 呕心、呕吐</li> </ul>
Nicotinic Acid Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 皮肤发红或皮疹、发痒</li> <li>• 头痛</li> <li>• 肠胃不适, 如胃灼热、腹泻</li> </ul>

如果您在服药后身体出现以上任何副作用或觉得身体不适, 请立刻通知医生。

## 我该采取什么防范措施?

以下图表指导您该采取的防范措施:

如果您:	就不该服用:
• 对药物任何成分敏感	Statins, Fibrates, Fat Binding Agents, Nicotinic Acid Group
• 被诊断患有肝脏疾病	Statins, Fibrates
• 已怀孕或正在哺乳	Statins, Fibrates, Fat Binding Agents, Nicotinic Acid Group
• 被诊断患有胆小管完全阻塞	Fat Binding Agents

请告诉医生您所服用的其它药物。这非常重要，因为有些药物如 Warfarin 可能对这组药物有相互作用，从而影响药效或增加药的副作用。

## 我该如何储存我的药物?

您应把药物储存原装罐里并加以关紧，然后置于阴凉干燥之处。

在不同的情况下，您可能需要不同的治疗。例如，如果您的血压过高，医生可能会建议您服用降压药。

然而，如果您患有糖尿病，那么您可能需要通过饮食、运动和药物治疗来控制血糖水平。

因此，在治疗高血压时，您需要综合考虑多种因素，以达到最佳的治疗效果。

同时，您还需要定期监测血压，以便及时调整治疗方案。

最后，您需要注意的是，治疗高血压是一个长期的过程，需要您坚持不懈地努力。

希望以上信息对您有所帮助，祝您早日康复！

如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与您的医生联系。

祝您身体健康，生活愉快！

如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与您的医生联系。



Ministry Of Health

