

NITROFURANTOIN



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



关于您的药物

Nitrofurantoin是一种治疗和预防尿道炎的抗生素。

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。

Nitrofurantoin最适宜和食物或牛奶一起服食。这样可以减低胃部的不适和提升药物的吸收。

尽管您感到身体康复了或状况已好转了，请务必把药物服食完毕。

请不要与胃片一起服食，因为胃片会减低Nitrofurantoin的吸收。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

这种药物可能引起什么副作用？

如果您发现脸部肿胀或变色、心绞痛、颤抖、咳嗽、发烧、身体不适、声音沙哑、皮肤瘙痒、关节或肌肉疼痛、呼吸困难、红疹、难以咽食、嘴唇/手/脚肿胀，请即刻告知您的医生。

您可能会感到恶心、腹泻和腹胀。您的尿液也可能呈锈黄色。这些是普遍的副作用，不必感到惊惶。

这种药物可能造成短暂性脱发。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

我应该注意些什么？

请告知您的医生：

- 您是否患有任何疾病，如葡萄糖六磷酸盐脱氢酶缺乏症（G6PD Deficiency）和肾衰竭。
- 您是否是糖尿病患者。这种药会使尿液检验呈假阳性反应。请和您的医生商量您的饮食和降血糖药的剂量。勿擅自更改饮食和药量。
- 您是否正服用其他药物、草药、辅助品或维他命。
- 您是否对任何药物过敏或服药期间产生敏感症状，敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。
- 您的症状几天后没有好转或反而恶化。
- 您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。

