

医药知识

肌肉松弛剂

SKELETAL MUSCLE RELAXANTS

Baclofen
Eperisone



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



SINGHEALTH / PIL / C125R0



关于您的药物

Baclofen和Eperisone是一种肌肉松弛剂。此类药物用以舒缓因脊髓受伤而导致的肌肉僵直和硬化。它们也有镇痛作用和改善行动能力。

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

Baclofen和Eperisone通常是在饭后服食，每日服三次。Baclofen的效果需要服食三至四天后才开始见效。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

这种药物可能引起什么副作用？

这种药可导致嗜睡、神志不清并影响判断能力。因此，服药后不可驾驶或操纵机械。其他的副作用包括失眠、说话含糊不清和肌肉虚弱无力。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

我应该注意些什么？

请告知您的医生您正服用的其他药物、草药、辅助品或维他命。

如果您对任何药物过敏或服药期间产生敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。在未获得医生的许可前，不可私自中断疗程。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。

