

CLOPIDOGREL TICLOPIDINE



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



关于您的药物

Ticlopidine和Clopidogrel是一种抗凝血药。它可减低再次中风的机率。医生通常开这种药给曾经中风或高风险的病患。

血块的凝结导致脑血管的阻塞，继而引至中风。Ticlopidine和Clopidogrel可预防血块的形成。然而，这些药物也可能导致严重流血。

在未开始服食此药之前，请告知您的医生：

- 您是否对Ticlopidine或Clopidogrel过敏。
- 您是否怀孕或哺乳。
- 您是否将进行任何手术（包括牙科手术），因为这些药物可能增加手术中或手术后流血过多的危险性。
- 您是否患有其他疾病如：
 - 低血小板
 - 血友病
 - 肝病或肝衰竭
 - 肾脏病或肾衰竭
 - 近期内动过手术

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。饭后服食药物可减低肠胃不适。

若有疑问，请向您的药剂师询问正确的服用方法。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

如果以下的副作用发生，请即刻告知您的医生：

- 敏感症状-奇痒或荨麻疹、脸或手脚麻痹、刺痛或灼热
- 手肿胀、嘴唇或喉咙肿胀或刺痛、皮肤出现红斑点
- 胸口闷或呼吸困难
- 严重腹泻、噁心、呕吐、食欲不振或上腹疼痛
- 皮肤出现红疹、水疱或脱皮现象
- 非寻常性的流血、瘀伤或虚弱
- 深色的尿液或浅色的粪便
- 皮肤或眼白变黄
- 发烧、颤抖、喉咙痛

如果以下较轻微的副作用出现，请向您的医生征询意见：

- 腹胀、胃痛、胃风
- 轻微性皮疹
- 轻微性的腹泻、噁心、昏眩
- 呕吐或食欲不振

我应该注意些什么？

这些药物可能会减少您体内的某些血细胞。因此，您可能会较容易流血或受到瘀伤。为了及早发现这些副作用，您的医生会安排您回医院做例行血液检测。请遵守医生的指示进行检测。一般上，若无异状，疗程开始三个月后就不需要做那么频繁的血液检测。

请告知您的医生、牙医、护士和药剂师您正服食这些药物。Ticlopidine或Clopidogrel可能会增加外科或牙科手术中流血过多的机率。因此，您需依照医生的吩咐在手术前停止服食此药。

请告知您的医生和药剂师您正服用的其他药物、草药、辅助品或维他命。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。