

关于您的药物

Amantadine、Benzhexol、Entacapone和Selegiline可单独或配合其他帕金森病药物，如含有LEVODOPA的药物，一起控制帕金森病的病情。这些药物可改善患者肌肉的活动性和减低肌肉的僵直程度。

我该如何服用这种药物？

这些药物通常在饭后服食。如果您感到难以入眠，请提早在下午或睡前几小时服食最后一剂的Amantadine和Selegiline。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘了服药数次，请向您的医生征询意见。

这种药物可能引起什么副作用？

如果您感到任何副作用持续或恶化，请向您的医生征询意见。

Amantadine

- 消化系统：恶心、腹泻或便秘、口干、食欲不振
- 心血管：低血压、手脚肿胀
- 中枢神经系统：晕眩、头痛、失眠、发恶梦、情绪化
- 皮肤：网状皮疹
- 呼吸系统：鼻腔干燥

Benzhexol

- 消化系统：便秘、口干、喉咙干
- 呼吸系统：鼻腔干燥
- 皮肤：干燥

Entacapone

- 消化系统：噁心、腹泻或便秘、腹痛
- 神经肌肉和骨骼：迟发性异动症（不寻常的动作）
- 中枢神经系统：晕眩、疲惫、幻觉
- 泌尿系统：尿液呈现红棕色

Selegiline

- 消化系统：腹痛、口干、噁心
- 神经肌肉和骨骼：迟发性异动症（不寻常的动作）
- 中枢神经系统：情绪化或精神不稳定、晕眩、失眠

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

我应该注意些什么？

当您从躺着或坐着的姿势站起，您可能会感到晕眩或头昏。请慢慢起身，快速起身会令您感到头晕。若此症状恶化或没有好转，请向您的医生征询意见。

有些病患会感到晕眩、嗜睡或视力模糊。除非您确定您警觉性和视力没有被药物影响，请勿服药后驾驶或操纵机械。

切勿急于恢复日常活动以免跌伤。开始服食药物后，您的身体需要慢慢调整平衡感和调和动作。因此，勿操之过急。

这些药物会造成口干。因此，您可含冰块或糖舒解口干问题并多喝水。服食Benzhexol的病患较少冒汗，容易在运动或热天气时中暑。因此，请避免曝晒或过度运动。

药物食物的交互作用：

服食Amantadine、Benzhexol或Entacapone时饮用酒精或其他影响中枢神经的药物会令患者更加嗜睡、晕眩、困惑和头晕。

服食高剂量的Selegiline时（高于10毫克/日），请避免食用含有大量Tyramine的食物。Tyramine常包含在发酵的食物中，如乳酪、腌制的肉类和熟透的水果。您也须避免食用含有酒精或咖啡因的食物或饮品，如咖啡、茶、可乐和巧克力。同时服食这些食物或饮料会导致您的血压上升并引起心绞痛、头痛、噁心或呕吐。如果以上的症状出现，请向您的医生征询意见。

同时服用其他药物可能导致药物交互作用。请告知您的医生您正服用的草药、辅助品、维他命或其他药物。

切勿突然停止服食这些药物，因为这会导致反效果。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。