类固醇鼻腔喷雾剂 CORTICOSTEROID NASAL SPRAYS



















关于您的药物

类固醇鼻腔喷雾剂可减少因过敏原引起的鼻腔症状。这种鼻腔喷雾剂可减少您的鼻塞症状和过敏性鼻炎的其他症状。

我该如何服用这种药物?

使用前:

- 将瓶子摇匀后开盖。
- 用您的食指和中指按着启动器,而拇指则支撑着瓶子的底部。
- 如果您正启用新的喷雾剂或已放置超过一个星期的喷雾剂,请先按启动器数次直至有喷雾从喷嘴中喷出。试用时,请将喷嘴朝外喷射。

使用喷雾剂:

- 1. 轻轻地用鼻子呼气以便鼻腔通畅。
- 2. 用拇指按着一个鼻孔,然后将喷雾剂的喷嘴塞入另一个鼻孔中。头部稍微向前倾斜以让喷雾剂笔直站立。
- 3. 当您开始透过鼻子吸气时,按下喷雾剂的启动器使药物喷出。
- 4. 停止呼吸5秒钟, 然后慢慢地用口呼气。
- 5. 如果您需要使用两剂喷雾, 重复步骤3和步骤4。
- 6. 如果您需要换鼻腔使用喷雾, 重复步骤2至步骤4。

使用后:

• 用纸巾或清洁的手巾抹干净喷嘴后把盖关好。

请勿用任何尖利的硬物插入喷嘴中。这样会破坏喷雾剂的喷雾系统。

如果我忘了服药,应该怎么办?

如果您忘记用药,请在记得时马上使用。如果已接近下一次的用药时间,应舍弃此次药物,恢复到下次正常的用药时间。千万不可服用双份药量。

这种药物可能引起什么副作用?

此药物的副作用包括:

- 鼻腔和喉咙干燥及不舒适
- 令人不适的味道
- 鼻腔流血

将流入喉咙的药吐出及用水漱口可减低喉咙干燥和味觉的问题。

我应该如何储存这种药物?

将您的鼻腔喷雾剂储存在阴凉及干燥的地方,避免阳光照射。

