

关于您的药物

Rifampicin、Isoniazid、Pyrazinamide和Ethambutol是抗肺结核（Tuberculosis又称TB）的药物。它们可以杀死或抑制结核杆菌的生长。要有效的治疗肺结核，几种抗肺结核药物须同时使用。

我该如何服用这种药物？

Pyrazinamide:

Pyrazinamide药丸需每日服食一次（每日相同时间），可在饭前或饭后服食。

Isoniazid:

Isoniazid药丸需每日服食一次（每日相同时间），空腹服食。

您的医生将开给您维他命B₆（Pyridoxine）。每日服食这种维他命可减低一些Isoniazid的副作用。请勿忘记服食。

Rifampicin:

Rifampicin胶囊需每日服食一次，空腹服食。

Ethambutol:

Ethambutol药丸需每天早上服食一次，可在饭前或饭后服食。

您将需要服食这些药物长达六个月。为了确保您的肺结核完全治愈，尽管您感到身体康复了或状况已好转了，请必须把药物服食完毕。如果没把疗程服完，感染可能会复发或导致细菌对抗生素产生抗性。因此，千万不可忘记服食药物。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

如果您的身体开始出现红疹、关节或肌腱疼痛或发炎、脸部肿胀或呼吸困难，请即刻向您的医生求诊。

如果以下的症状出现，请向您的医生征询意见。

Pyrazinamide:

虽然Pyrazinamide的副作用并不普遍，它还是可能发生。如果以下的症状恶化或没有好转，请向您的医生征询意见：

- 肠胃不适
- 疲惫

如果以下的症状出现，请即刻向您的医生寻求诊治：

- 呕吐
- 皮肤或眼白变黄
- 深色的尿液
- 关节疼痛和肿胀

Isoniazid:

虽然Isoniazid的副作用并不普遍，它还是可能发生。如果以下的症状恶化或没有好转，请向您的医生征询意见：

- 腹泻
- 视力问题

如果以下的症状出现，请即刻向您的医生寻求诊治：

- 手脚麻痹或刺痛
- 异常的流血或瘀伤
- 腺肿胀
- 腹痛或腹部硬痛
- 喉咙痛

Rifampicin:

虽然Rifampicin的副作用并不普遍，它还是可能发生。您的尿液、粪便、口水、痰、汗水和眼泪可能会呈橙红色。这种现象是正常无害的。若以下的症状恶化或没有好转，请向您的医生征询意见：

- 头痛
- 发冷又发热
- 肌肉或骨骼疼痛
- 腹泻
- 呕吐

如果以下的症状出现，请即刻向您的医生寻求诊治：

- 皮肤或口腔溃烂
- 发烧
- 皮肤或眼白变黄

Ethambutol:

虽然Ethambutol的副作用并不普遍，它还是可能发生。如果以下的症状恶化或没有好转，请向您的医生征询意见：

- 肠胃不适
- 呕吐

如果以下的症状出现，请即刻向您的医生寻求诊治：

- 视力模糊
- 无法分辨红色和青色
- 视力变化

我该注意些什么？

在还未开始服食抗肺结核药前，请告知您的医生和药剂师：

- 您是否对任何药物过敏
- 您是否正服用其他药物、草药、辅助品或维他命。
- 您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕
- 您是否患有或曾经患有任何肝病。

Pyrazinamide:

在还未开始服食Pyrazinamide前，

- 请告知您的医生您是否患有或曾经患有痛风（Gout）、肝病、肾病或糖尿病。
- 您须知道，这种药可能导致尿液酮体检测（Ketone Test）将呈假阳性。在更改您的饮食习惯或降血糖的药量前，请向您的医生咨询。
- 您须知道，Pyrazinamide会导致您的皮肤对阳光过敏。因此，减少曝晒于阳光底下、穿长袖衣、长裤、戴墨镜或搽防晒霜。