

BROMOCRIPTINE



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



关于您的药物

Bromocriptine可用于治疗以下疾病：

- 男性和女性的不育症、男性荷尔蒙问题、女性月经问题、良性乳房肿瘤和因激乳素过多引起的不寻常性乳汁分泌
- 抑制生产后的乳胀和停止乳汁分泌
- 帕金森病
- 肢端肥大症（Acromegaly）（生长激素分泌过剩）
- 脑下垂体肿瘤

我该如何服用这种药物？

如果空腹服食药物令您感到肠胃不适，您可以和食物或牛奶一起服食。睡前服食可舒缓噁心的感觉。

某些病患需服食几个星期的药物才开始见效。请勿因未见药效而停止服药。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。

这种药物可能引起什么副作用？

- 消化系统： 噁心、便秘、食欲不振、口干
- 心血管： 低血压（由蹲、坐或睡卧姿势站起时感到昏眩、头晕或昏厥）、寒冷时手指和脚趾的麻痹或刺痛会加剧
- 中枢神经系统： 忧郁、困惑、幻觉
- 神经肌肉和骨骼： 脚抽筋、身体动作失控（包括脸、舌头、手臂、手、头和身体）
- 呼吸系统： 鼻塞

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

某些副作用只在服食高剂量的Bromocriptine时（如治疗帕金森病、肢端肥大症或脑下垂体肿瘤）才出现。

某些副作用只是暂时性的，持续服食药物后会慢慢消失。

如果您感到以上症状持续或恶化，请向您的医生征询意见。

我应该注意些什么？

Bromocriptine可能导致嗜睡或昏眩。因此，服药后请勿驾驶或操纵机械。疗程刚开始时较容易感到昏眩。第一剂药应在睡前服食以减低昏眩引起的不适。如果从睡卧或坐姿站起时感到昏眩，请慢慢起身。

与酒精一起服食Bromocriptine可能导致视力模糊、心绞痛、困惑或心跳加速。

同时服用其他药物可能导致药物交互作用。请向您的医生咨询有关的药物交互作用。

请勿擅自停止服食此药。

怀孕期间：不打算怀孕的女性应采用非荷尔蒙避孕法，因为荷尔蒙避孕药会降低Bromocriptine的疗效。如果您怀孕了，请与您的医生商量是否应该继续服食Bromocriptine。

哺乳期间：Bromocriptine停止乳汁分泌。尽管还未退奶，请勿哺乳。

我应该如何储存这种药物？

请保存在清凉干爽的地方。避免曝晒于太阳或搁置在温热潮湿的地方。