

医药知识

# 抗生素 ANTIBIOTICS

Co-Trimoxazole, Dapsone  
Pyrimethamine, Trimethoprim



MINISTRY OF HEALTH  
SINGAPORE



SINGHEALTH / PIL / C90R0



## 关于您的药物

Co-Trimoxazole、Dapsone、Pyrimethamine和Trimethoprim是一种抗生素。它们可以治疗或预防感染病。

## 我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

这些药物可空腹服食。如果您感到肠胃不适，您可以在饭后服食此药。服药时，请喝足一杯水。

尽管您感到身体康复了或状况已好转了，请必须把药物服完为止。您的病症可能在病菌被消除前好转。

## 如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

请将药物保存于远离孩童的地方  
请将过期或不再服用的药物丢弃

## 这种药物可能引起什么副作用？

肠胃不适如噁心、呕吐和红疹是最普遍的副作用。如果发现红疹或皮肤痒，请即刻向您的医生征询意见。

其他的副作用包括尿液或粪便有血、牙龈流血、皮肤脱皮或持续腹泻。如果这些较罕见的症状出现，请即刻向您的医生求诊。

这些药物可能导致您对阳光过敏，如出现红疹、痕痒、或严重晒伤。因此，服用此药时请减少曝晒于阳光底下（尤其在早上10点至下午3点之间）、穿长袖衣、长裤或擦防晒霜（至少SPF15）。

## 我该注意些什么？

### 告知您的医生或药剂师：

- 如果您正服用的草药、辅助品、维他命或其他药物。
- 如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。
- 您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。
- 您是否患有任何疾病，如贫血、肝病、肾病、癫痫症或葡萄糖六磷酸盐脱氢酶缺乏症（G6PD Deficiency）。这些疾病可能会增加这些药物的副作用。

## 我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。