

医药知识

散瞳剂眼药水

CYCLOPLEGIC & MYDRIATIC PREPARATIONS

Atropine Eyedrops
Homatropine Eyedrops
Tropicamide Eyedrops



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



SINGHEALTH / PIL / C91R0



关于您的药物

散瞳剂眼药水主要是在检验眼睛时用以扩散瞳孔以便医生可以通过仪器检查您眼背的组织。这些药物也可在眼科手术的前后使用。

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示使用药物。

正确使用眼药水/药膏的步骤：

- 双手用肥皂清洗干净。仔细阅读标签上的指示。
- 使用前把眼药水摇匀。
- 头向后倾斜，脸部向上。
- 轻轻地拉下眼皮形成眼袋。慢慢挤出一滴眼药水入眼袋内。为保持清洁，请勿让眼药水的开口处触碰到眼睛或其他表面。
- 如果是眼药膏，轻轻挤出0.5至1公分的眼膏入眼袋内。
- 放开眼皮，关上眼睛至少30秒。请勿眨、搓、抹或挤压眼睛。
- 轻轻地按着靠鼻梁的下眼角1至2分钟，以让眼睛充分地吸收药物。
- 如果您需使用超过一滴眼药水或接着使用其他眼药水，请稍等5至10分钟后才使用（这可避免眼药水被稀释或溢出眼睛，并可避免药物的相互作用）。
- 如果您需同时使用眼药水和眼药膏，请先使用眼药水。

如果您使用隐形眼镜，请勿戴您的隐形眼镜直至疗程完毕。

开启后的眼药水不可使用超过四个星期。一旦开启，请在标签记录下日期以便提醒您该丢弃的日期。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记使用眼药水，请在记得时马上使用。如果已接近下一次的用药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的用药时间。千万不可使用双份药量。如果您忘记用药数次，请征询您医生的意见。

这种药物可能引起什么副作用？

这种药物的副作用包括昏眩、头痛、鼻塞、视力模糊、眼睛干、口干和眼睛畏光。您可能会经历以上的这些副作用。但是，随着身体的调适，这些症状会逐渐消失。如果这些副作用持续，请即刻向您的医生洽询。

如果以下的症状出现，请向您的医生寻求诊治：

- 眼睛周遭出现红疹
- 眼角膜（眼白部位）红肿

如果您感到眼睛畏光，请戴上墨镜以减低眼睛的不适。

如果您的视力模糊，使用此药后请勿驾驶或在光线不足的地方工作。

我应该注意些什么？

告知您的医生：

- 您是否对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。
- 如果您的眼睛在五至七天后恶化或没有好转。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。