

医药知识

利尿药

DIURETICS II

Bumetanide, Amiloride
Spironolactone, Triamterene



MINISTRY OF HEALTH
SINGAPORE



SINGHEALTH / PIL / C93R0



关于您的药物

Diuretics促进肾脏排出盐与水份，让人排出更多尿液。这使血容量降低，继而减轻心脏与血管的负担，并降低血压。

我该如何服用这种药物？

您的医生将依您的状况决定药量。请依照医生的指示服食药物。

若有疑问，请向您的药剂师询问正确的服用方法。

除非您的医生或药剂师另有吩咐，请在饭后服食此药。如果您的药量是每日一次，请在早上服用。如果您的药量是每日两次，请在早上和下午4点以前服用此药以免夜尿频繁而影响睡眠。

Bumetanide可能导致您的身体流失过多的钾盐。如果医生开Potassium Chloride药丸给您补充血液中的钾，请记得服食您的药丸。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果您忘记服药，请在记得时马上服用。如果已接近下一次的服药时间，应舍弃此次药物，恢复到下次正常的服药时间。千万不可服用双份药量。如果您忘记服药数次，请征询您医生的意见。

请将药物保存于远离孩童的地方
请将过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

当您从睡卧或坐姿站起时，您可能感到昏眩或头晕。这种状况尤其发生在早晨起身时。减缓起身的速度以免跌倒。若此症状恶化或持续，请向您的医生征询意见。

您可能感到虚弱、无力、疲惫、经常口渴、肌肉痉挛或食欲不振。这些都是低血钾的症状。

您的皮肤也可能出现红疹或对阳光过敏。

如果以上副作用发生，请向您的医生征询意见。

我应该注意些什么？

如果您的日常饮食有钠盐的限制，请遵守吩咐。

如果您向其他医生或牙医求诊，请记得告知他们您正服食此药物。

请告知您的医生和药剂师您正服用的其他药物、草药、辅助品或维他命。

如果您对任何药物过敏或在服药期间出现敏感症状，请告知您的医生。敏感症状有：脸/眼睛/嘴唇肿胀、呼吸困难、皮肤出现红疹或痒。

请告知您的医生您是否怀孕、哺乳或可能在疗程期间受孕。

我应该如何储存这种药物？

药物应储存在阴凉及干燥的地方，避免阳光照射。除非个别药物标签上有特别指示，一般无需存放在雪柜内。