

服药后若出现下列症状, 请立即停止服用并立刻与您的医生联络:

- 皮疹或荨麻疹
- 发痒
- 呼吸或吞咽困难
- 皮肤与眼白呈黄色

我应该注意些什么?

在服用这种药物以前,

- 如果您有对任何药物过敏, 请通知您的医生或药剂师。
- 如果您正在服用其他药物, 请通知您的医生或药剂师。
- 如果您已经怀孕, 或计划生育, 或正在哺乳期间, 请通知您的医生。
- 如果您患有或曾经患有肝脏或肾脏疾病, 请通知您的医生。


我应该如何储存这种药物?

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方, 并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



质子泵抑制剂 Proton Pump Inhibitors

Esomeprazole • Lansoprazole • Omeprazole • Pantoprazole • Rabeprazole

关于您的药物

这种药物能减少胃酸的分泌。它用于治疗十二指肠溃疡，胃溃疡以及胃食管反流性疾病 – 一种因胃酸返流至食道而引起的不适及灼热感。这种症状也称为胃灼热 (heartburn)。

我该如何服用这种药物？

这种长效性的药物只需在每天饭前服用一次。请您依照药物标签上的指示服药。若有任何疑问，请向您的医生或药剂师询问。

即使您觉得病情已经好转，也请继续服药。若没有医生指示，请不要擅自停止服药。

请将胶囊整颗吞服。请勿打开胶囊、咀嚼或磨碎胶囊。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不要一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用？

虽然这种药物的副作用比较少见，但副作用仍可能发生。这些副作用可能会随着身体在治疗过程中逐渐适应药物而消失。但如果以下副作用持续或引起不适，请向医生查询。

药物	副作用
Esomeprazole	头痛
Lansoprazole	腹泻
Omeprazole	肚子痛
Pantoprazole	呕吐
Rabeprazole	胀风

如果服药后出现任何不寻常的副作用，请向医生查询。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方