

服药后若出现下列症状, 请立即停止服用并立刻与您的医生联络:

- 呼吸困难
- 小腿或足部肿胀
- 粪便带血或呈现黑色及黏稠
- 虚弱

我应该注意些什么?

在服用这种药物以前,

- 如果您对任何药物过敏, 请通知您的医生或药剂师。
- 请告诉您的医生或药剂师您目前正在服用的其他药物, 尤其是治疗忧郁症、心脏病、感冒、松弛肌肉的药物, 或是抗生素或维他命。若您在服用以上药物的同时医生又让您服用抗酸药, 请勿在服用抗酸药的两个小时内服用以上的药物。
- 如果您患有或者曾经患有肾脏疾病, 请告诉您的医生。
- 如果您已经怀孕, 或计划生育, 或正在哺乳期间, 请告诉您的医生。
- 抗酸药内通常含有大量盐分。若您需维持低钠盐饮食(low-sodium diet), 请和医生讨论后再服用此药。

我应该如何储存这种药物?

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方, 并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



抗酸药 Antacids

C20R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

抗酸药能缓和胃灼热 (Heartburn) 所引起的症状、胃部不适或消化不良。抗酸药也可用于治疗胃或十二指肠溃疡。这类药物有时也可用于其它用途；请向您的医生或药剂师获取更多详情。

药物	作用
<ul style="list-style-type: none"> • Magnesium carbonate • Magnesium trisilicate • Aluminium hydroxide • Sodium bicarbonate • Calcium carbonate 	中和胃里过多的胃酸。

- 大多数的抗酸药由多种药物合成。一些常见的品牌有：Mylanta®, Gaviscon®, Mucaine® 及 Gelusil®。

我应该如何使用这种药物？

这类药物通常是可嚼碎的药片或口服液。药片须全部嚼碎服用；不能整颗吞服。服用后应以一整杯开水送下。口服液则应在服用前摇匀，以确保药物均匀混合。

一般而言，在服用抗酸药的1至2个小时内，请勿口服其他药物或进食。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

请小心遵照药物标签或说明书上的指示服药。若您对如何正确服药有任何疑问，请向您的医生或药剂师询问。

除非医生另有指示，否则请勿连续服用抗酸药超过1至2个星期。若病情不见好转，您可能需要药性更强的药物。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用？

虽然这种药物的副作用非常罕见，但仍可能发生，然而这些副作用可能在治疗过程中因身体逐渐适应药物而消失。但如果以下副作用持续不退或引起不适，请向医生查询。

药物	副作用
Magnesium carbonate Magnesium trisilicate Aluminium hydroxide Sodium bicarbonate Calcium carbonate	腹泻 (含镁盐的抗酸药) 便秘 (含铝盐的抗酸药) 食欲不振

如果服药后出现任何不寻常的副作用，请向医生查询。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方