

服药后若出现下列症状，请立即与您的医生联络：

- 心跳加速或不规则
- 癫痫
- 幻觉
- 气喘或呼吸困难

我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 如果您对任何药物有过敏反应，请通知您的医生或药剂师。
- 如果您正在怀孕，请通知您的医生或药剂师。
- 请告知您的医生或药剂师您目前正在服用的其他药物。
- 如果您患有或曾经患有其他疾病，尤其是哮喘或青光眼，请通知您的医生。
- 在服药期间，避免摄取酒精，因为此药能加强酒精的效力。
- 这种药物可能令您昏昏欲睡或注意力减退。请在清楚自己身体对药物的反应后才驾驶、操作器械，或从事一些因注意力减退后会产生危险的活动。


我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



止吐药

Anti-nausea Medicine

C23R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

这种药物可用于防治恶心、呕吐及晕动病（motion sickness）所引起的眩晕症状。

这类药物有时也可用于其他用途；请向您的医生或药剂师获取更多详情。

药物	作用
Promethazine Dimenhydrinate Cyclizine Cinnarizine	它通过调节脑内的平衡机制来达到防治晕动病的效果。

我该如何服用这种药物？

请于启程前的1至2小时或至少半个小时前服用此药。若需多服，可以每4至6小时服用一次。如果您不清楚如何正确地服用这种药物，请向您的药剂师查询。

此药可与食物一起服用。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用？

虽然这种药物的副作用并不常见，但还是有可能发生。这些副作用会随着身体在治疗过程中逐渐适应药物而消失。但如果以下副作用持续不退或造成不适，请通知您的医生。

药物	副作用
Promethazine Dimenhydrinate Cyclizine Cinnarizine	嗜睡 眩晕（较少见） 口腔、鼻腔或喉咙干燥。

若在服药期间出现任何不寻常副作用，请向您的医生查询。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方