

- 如果您患有或者曾经患有其他疾病，尤其是前列腺问题、青光眼、肝脏及肾脏问题，请通知您的医生。
- 在服药期间，请避免摄取酒精，因为这类药物可加强酒精的效果。
- 这种药物可能令某些人感到昏昏欲睡或注意力比平时减退。请在清楚自己身体对药物的反应后才驾驶、操作机械，或从事一些因注意力减退会产生危险的事务。

某些抗组胺药比其它抗组胺药更容易产生昏沉的副作用。一般上新一代的抗组胺药较少造成昏沉的副作用，例如：Loratidine 及 Cetirizine。

抗组胺药也可引起口干、鼻腔及喉咙干燥。您可通过口含无糖分糖果或冰块，或使用唾液代替品来暂时缓和口干的状况。

但如果您的口干症状持续超过两个星期，请向医生查询。


在您须进行任何皮肤过敏测试之前，请通知医生您正在服用此类药物，因为此类药物将影响测试的结果。

我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



病患 服药须知



抗组胺药 Antihistamines

关于您的药物

这类药物用于防治花粉热、瘙痒、流鼻水及其它过敏性疾病。
这类药物有时也有其他用途；请向您的的医生或药剂师获取更多详情。

药物	作用
Promethazine Chlorpheniramine Hydroxyzine Loratadine Cetirizine Buclizine	它们能预防由体内组胺 (histamine) 所引起的作用。组胺可引起瘙痒、打喷嚏、流鼻水及眼睛流泪。在某些情况下，它会缩小肺部呼吸道，引起呼吸困难。这类药物有口服片剂及液体制剂。

我该如何服用这种药物？

药物的分量因人而异。请按照医生的指示或药物标签上的指示服药。如果您的服药分量与别人不同，请勿擅自更改分量，除非经医生指示。

您每天所需服用的次数以及两个剂量之间的间隔时间是由药物作用时间的长短而定。

若您所服用的是长效药片，请整颗吞服。请勿弄碎、捣烂或嚼碎药片。

抗组胺药可与食物一起服用。

若您对如何正确服药有任何疑问，请向您的药剂师询问。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用？

虽然这种药物极少引起副作用，但副作用仍可能发生，然而这些副作用有可能在治疗过程中因身体逐渐适应药物而消失。但如果以下副作用持续或引起不适，请向医生查询。

药物	副作用
Promethazine Chlorpheniramine Hydroxyzine Loratadine Cetirizine Buclizine	昏昏欲睡 晕眩 口腔、鼻腔或喉咙干燥

若在服药期间出现任何不寻常的副作用，请向您的医生查询。

服药后若出现下列症状，请立即打电话与您的医生联络：

- 心跳加速或不规则
- 癫痫
- 幻觉
- 气喘或呼吸困难

我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 如果您对任何药物有过敏反应，请通知您的医生或药剂师。
- 如果您正在服用其他药物，尤其是治疗抑郁症、心脏病的药物、阿司匹林 (aspirin) 或是松弛肌肉的药物、催眠药、安眠药或镇定剂，请通知您的医生或药剂师。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方