

我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 如果您对任何药物敏感，请通知您的医生或药剂师。
- 如果您正在服用其他成药，包括营养品或维他命，请通知您的医生或药剂师。
- 如果您患有其他疾病，请通知您的医生。
- 如果您已经怀孕、或计划生育、或正在哺乳中，请通知您的医生。
- 在服药期间，避免摄取酒精。
- 这种药物可能令您昏沉或注意力减退。请在清楚自己身体对药物的反应后才驾驶或操作机械，或从事一些如果注意力不集中会产生危险的事务。

我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



治疗“湿咳”的药物

Medicine To Treat “Wet Coughs”

Guaiifenesin • Diphenhydramine

关于您的药物

Guaiphenesin能稀释气管内的痰，使痰更容易被咳出。这使到气管通畅，缓和呼吸。Robitussin 和 Actified Expectorant 都是含有guaiphenesin 的成药。

Diphenhydramine 是一种抗过敏药，能使气管里的分泌物变干。它能减少痰的产生，并有扩张支气管的作用。

这种药物是如何使用的？

请按照医生的指示服药。如果您不清楚应该如何正确地服用这种药物，请向药剂师查询。

请在服用这种药物时多喝水（除非医生指示您控制水份的摄取）。

如果症状在 7 天内没有任何进展或发高烧、出现皮疹或持续性的头痛，请向医生查询。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用？

虽然这种药物的副作用很罕见，但仍可能发生。如果出现这些严重副作用或副作用持久不退，请通知您的医生。

药物	副作用
Guaiphenesin	头痛 胃部不适 恶心或呕吐 腹泻
Diphenhydramine	口腔、鼻腔、喉咙干燥 昏沉 胃部不适 头痛 视力模糊

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方