

## 我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 如果您对任何药物有过敏反应，请通知您的医生或药剂师。
- 如果您正在服用其他药物，尤其是治疗抑郁症、癫痫症、感冒的药物，或松弛肌肉的药物、安神药、安眠药或镇定剂，请通知您的医生或药剂师。
- 如果您患有其他疾病，特别是哮喘或其他肺部疾病、排尿困难、癫痫症、高血压以及心脏或肝脏疾病，请通知您的医生。
- 如果您已经怀孕或计划生育，或正值哺乳期间，请通知您的医生。
- 在服药期间，避免摄取酒精。
- 这种药物可能令您昏昏欲睡或警觉性减退。请在清楚自己身体对药物的反应后才驾驶、操作机械，或从事一些注意力不集中容易产生危险的事务。

## 我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

# 病患 服药须知



# 治疗干咳的药物 **Medicines To Treat 'DRY' coughs**

Diphenhydramine • Dextromethorphan • Clobutinol  
Promethazine and Codeine • Pholcodine • Tripolidine

## 关于您的药物

Promethazine 和 Tripolidine 属于抗组胺药(Antihistamines)，它们能减少痰的分泌及减少咳嗽的次数。它们也可以扩张肺部里的小支气管。含有以上抗组胺药的成药有：Actifed, Procodin 以及 Dhasedyl。Codeine, pholcodine, dextromethorphan 及 clobutinol 则用于舒缓及减少咳嗽的次数。含有以上止咳药物的成药有：Actifed DM, Duro-Tuss, Procodin, Dhasedyl, Tussils 及 Silomat。

## 我该如何服用这种药物？

请按照医生的指示服药。如果您不清楚应该如何正确地服用这种药物，请向您的药剂师查询。

在服用这种药物时应多喝水（除非您的医生限制您水份的摄取）。

如果症状在 7 天后还未有进展，或您有发高烧，皮疹或持续性头痛的症状，请立刻求医。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

## 如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

## 这种药物可能引起什么副作用？

虽然这种药物的副作用并不常见，但还是有可能发生。如果出现严重副作用或副作用持续不退，请通知您的医生。

药物	副作用
Promethazine Tripolidine	口干，鼻腔及喉咙干燥 昏沉 胃不舒服 头痛 视力模糊 排尿困难
Dextromethorphan Pholcodine Codeine Clobutinol	晕眩 昏睡 恶心 / 呕吐 胃不舒服 便秘

若在服药期间出现任何不寻常副作用，请向您的医生查询。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方