

请注意：若您有任何瘀伤以及 / 或任何受病菌感染的症状，尤其是喉咙痛，或有口腔溃疡，或在治疗过程中出现发烧症状，请立刻停止服用药片及**立即**通知您的医生。您必须接受验血以确定您的骨髓功能是否被抑制，然后才可继续服药。


我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



抗甲状腺药 Anti-thyroid Medicine

C24R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

您的医生开给您的是抗甲状腺(anti-thyroid)药片。Carbimazole 和 Propylthiouracil 是常用的抗甲状腺药。抗甲状腺药用于减少患有甲状腺机能亢进(hyperthyroidism)病人体内的甲状腺激素(thyroid hormones)的形成。

我该如何服用这种药物?

Carbimazole 和 Propylthiouracil 都是口服药片。您所需要的剂量将由医生根据个别需要而决定，并且会在治疗过程中分阶段调整。

Carbimazole 的剂量开始时通常是一天 20mg 至 60mg，可一次或分几次服用。若病情获得控制，药物的剂量可减至一天 5mg 至 15mg。

Propylthiouracil 的剂量开始时通常是一天 300mg 至 600mg，可分一次或几次服用。若病情获得控制，药物的剂量可减至一天 50mg 至 150mg。

一般上，病情在服药后的一至三个星期内会有些许进步，而治疗效果会在四至八个星期内完全达到。为了能维持对甲状腺病情的控制，您需要连续服几个月的药。您的医生将会决定您什么时候可以停止服药。他有时也可能需要替您验血以确定您对药物治疗的反应。

放射碘 (Radio-iodine) 及外科手术也是甲状腺机能亢进的疗法。若您需要接受放射碘的治疗，您的医生会吩咐您暂时停止服用药片。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

如果我忘了服药，应该怎么办?

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用?

您在服药后的首八个星期内可能会有一些副作用。最常见的副作用是恶心、头痛、皮疹、瘙痒、胃不舒服及关节疼痛。较罕见的副作用有脱发、肌肉及肝脏出现问题。

若您有肌肉疼痛或发现您的皮肤或眼白变黄，或是您对以上或其他副作用感到担心，请告诉您的医生。

我应该注意些什么?

若您是孕妇请通知您的医生。虽然这类药物可用在怀孕期间使用，但仍须小心使用，因为它可通过胎盘而影响到胎儿。为了把药物对胎儿的影响减至最低，您的医生会开给您最低的有效剂量。您可能需要在分娩前的 3 至 4 个星期内停止服用药物。您在服药期间不宜哺乳。

在开始服药前，若您有肝脏问题，请让您的医生知道。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方