

我应该注意些什么？

如果您患有其他疾病，例如：心脏病或高血压，请让您的医生知道。医生可能需要降低甲状腺素的剂量，以避免副作用。如果您是糖尿病患者，您所需的胰岛素或口服抗糖尿病药物的剂量可能需要调高。


如果您现在正在服用其他药物，请告知您的医生，尤其是 warfarin、抗癫痫症药物及口服避孕药。在服用任何保健品之前，请事先向医生或药剂师查询。

如果您准备怀孕，请通知您的医生。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



Thyroxine Sodium

C62R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

您的医生开给您的药物是甲状腺素药片。甲状腺素是甲状腺所分泌的主要激素。它是调节人体的各种新陈代谢作用所不可或缺的一种激素 / 荷尔蒙。

甲状腺素分泌不足造成甲状腺官能不足症 (hypothyroidism)。原因可能是腺体先天分泌不足, 或因后天切除机能亢进甲状腺的手术, 或因接受放射碘治疗而造成。甲状腺素可用于补充以上激素不足的情况, 并让身体恢复正常的新陈代谢活动。

我该如何服用这种药物?

甲状腺素的药力非常持久, 因此只需一天服用一次, 一般在早餐前半个钟头服用。

甲状腺素的剂量因人而异。医生将根据简易的验血报告来调整您所需要的剂量。

大多数患者每天需要的剂量介于 50 至 200mcg。您在开始时可能只需服用低剂量 (较年老或有心脏疾病如心绞痛的患者一天可能只需服用 25mcg), 然后慢慢增加, 以减轻药物的副作用。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

如果我忘了服药, 应该怎么办?

如果忘记服药, 应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间, 就应舍弃此次药物, 恢复到下次正常服药的时间, 千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用?

由于甲状腺素是一种补充治疗剂, 只要是医生根据您的身体需求适当地调整药物剂量的话, 副作用一般上并不常见。

但如果剂量超出身体所需, 您可能会感到心跳加速和胸痛 (尤其心脏病患者)、肌肉抽筋、冒汗、颤抖、腹泻、不安、失眠或头痛。如果出现以上症状或其他不寻常症状, 请立即与医生联络。在调低甲状腺素剂量或停止服用后, 以上的症状一般会消失。

甲状腺素偶尔会引起过敏性反应, 例如: 皮疹、发痒或肿胀。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方