

我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 如果您对任何药物有过敏反应，请通知您的医生或药剂师。
- 请通知您的医生或药剂师您目前正在服用的其他药物，尤其是治疗抑郁症、心脏病、感冒的药物，或是松弛肌肉的药物、镇静药或安眠药。
- 如果您患有其他疾病，尤其是糖尿病、癫痫症、高血压、青光眼、心脏或血管疾病，请通知您的医生。
- 如果您已经怀孕，或计划生育，或正在哺乳期间，请通知您的医生。

使用此药物后可造成口腔及喉咙干燥。在每次使用后用水漱口能避免喉咙干燥的问题。

我应该如何储存这种药物？


请将口服药片储藏在密封容器里，并避免高温及阳光直接照射。

请勿刺穿、砸碎或焚烧喷雾剂容器，即使容器是空的。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



舒缓气喘的药物 Medicine To Relieve Asthma

C25R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

医生开给您用来舒缓气喘的药物。它们一般被称为支气管扩张剂 (bronchodilators)，因为它们能扩张肺部内的支气管。

药物	作用	输送方式
短效性 e.g. Salbutamol (Ventolin) Terbutaline (Bricanyl) Fenoterol (Berotec)	<ul style="list-style-type: none"> • 扩张肺部的气管。 • 通过增加肺部的气体流通以舒缓哮鸣、气喘及呼吸问题。短效性的支气管扩张剂被当作缓和剂 (relievers) 使用。 	此类药物有喷雾剂型及 / 或口服药片以及糖浆剂型。
长效性 e.g. Bambuterol (Bambec) Formoterol (Oxis)		

我该如何服用这种药物?

您应遵照医生的指示服药。如果您不清楚应该如何正确地服用或使用您的药物，请向您的药剂师或医生查询。

请按照指示使用药物。若非经医生指示，请勿使用超出药物标签上所指示的使用分量以及次数。若您使用此药的次数比平时更为频密，请通知您的医生，因为这可能意味着您的哮喘病并没有得到良好的控制。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

有些药品附有使用说明书。请您在仔细地阅读过后才使用药物。正确的喷雾法是非常重要的，因为这将确保药物能到达肺部以发挥最大的效用。

若您每两个小时使用此药物后仍感觉气喘，或您的病情恶化，请立即向您的医生询问。

若您不能很有效地把药物吸入肺部内，有一种可衔接于喷雾剂的特别容器可以帮助您。请向您的医生或药剂师请教。

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用？

这种药物的副作用虽然不常见，但仍有可能发生。这些副作用会随着身体在治疗过程中逐渐适应药物后而消失。但如果以下副作用持续不退或引起不适，请通知您的医生。

- 紧张或坐立不安
- 颤抖
- 心跳加速
- 晕眩
- 喉咙干或疼痛
- 恶心或呕吐
- 头痛

在服药期间若出现任何不寻常副作用，请向您的医生查询。

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方