

我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 若您有对任何食物、防腐剂、染料或药物，尤其是 penicillin 或 penicillamine 有过敏反应，请通知您的医生。
- 若您已怀孕或计划怀孕，请通知您的医生，因为如在怀孕期间服用 Penicillamine，可能导致胎儿畸形。
- 若您正在服用其他药物，请通知您的医生。
- 若您有其他病症，例如肾病或因 Penicillamine 所引起的血液疾病，请通知您的医生。

您必须定期接受血液检查，并定期复诊以让医生检查您病情的进展。

我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



Penicillamine

C57R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

这种药是用于治疗类风湿关节炎及威尔逊氏病（一种因体内“铜”无法正常代谢，造成铜过度囤积而产生毒性的疾病）。它也可用于避免肾结石及其他疾病。

我该如何服用这种药物？

医生将指示您必须服用的剂量及次数。切勿未经医生指示而擅自增加剂量或增加服用的次数。

这种药物最好是在空腹时服用（餐前至少1个小时或餐后2个小时）或在服用其他食物、牛奶或药物的至少1小时前或2小时后服用。如果您正在服用铁质或维他命制剂，请勿与这种药物一起服用，必须相隔2个钟头，以避免影响 penicillamine 疗效。

如果您是因避免肾结石而服用此药物，您必须在睡前喝两大杯的水并在半夜再喝两大杯的水。

如果您是因类风湿性关节炎而服用此药物，您会在2至3个月后才能感觉到药物的效果。如果您是因威尔逊氏病而使用这种药，则必须在1至3个月才能感觉到病情的好转。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

如果我忘了服药，应该怎么办？

如果忘记服药，应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间，就应舍弃此次药物，恢复到下次正常服药的时间，千万不可一次服用双倍的剂量。

这种药物可能引起什么副作用？

如有以下症状，请立即与医生联络：

- 无故发烧或喉咙痛
- 不寻常的出血或瘀青
- 皮疹、荨麻疹、发痒
- 尿液混浊、起泡
- 视觉起变化

其他较轻微的副作用包括：

- 味觉减退或食欲不振，
- 胃部不适、恶心、呕吐或腹泻

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方