

我应该注意些什么？

在服用这种药物以前，

- 如果您对任何药物过敏，请通知您的医生或药剂师。
- 如果您正在服用其他成药，特别是用来治疗忧郁症、心脏疾病、高血压、感冒、使肌肉松弛的药物、镇定剂或安眠药，请通知您的医生或药剂师。
- 如果您患有或曾经患有肝脏疾病，请通知您的医生。
- 这种药物可能令您昏沉或警觉性减退。在服用第一剂药或服用较高剂量后的12至24小时内，请勿驾驶车辆或操作机器。

您可能在服药后感觉头晕、晕眩或突然晕厥，尤其是当您从躺着或坐着的姿势站起来时。这些症状通常会在服用第一剂药后出现。所以第一剂药最好是在晚上服用。如果出现以上症状，请躺下休息，直到症状完全消失为止，然后再慢慢地起来。

我应该如何储存这种药物？

请将药物储藏在阴凉及干燥的地方，并避免潮湿、高温及阳光直接照射。



请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

病患 服药须知



Prostate-related Relaxants

Prazosin • Terazosin • Alfuzosin

C59R0

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方

关于您的药物

这种药物用于治疗男性的良性前列腺增生症 (benign prostatic hypertrophy) (前列腺肿大)。

这种药物也可用于其它病症。请向您的医生或药剂师查询。

药物	功能
Prazosin (Minipress®) Terazosin (Hytrin®) Alfuzosin (Xatral®)	松弛膀胱和前列腺的肌肉。 剂型为口服药片。

我该如何服用这种药物?

请按照医生的指示服药。如果您不清楚应该如何正确地服用这种药物, 请向您的药剂师查询。

第一剂药应在晚上睡前服用。请勿在未经医生指示下擅自停止服用这种药物。

如果我忘了服药, 应该怎么办?

如果忘记服药, 应该在记得时立即服用。但是如果已接近下一次的服药时间, 就应舍弃此次药物, 恢复到下次正常服药的时间, 千万不可一次服用双倍的剂量。

请把所有已过期或不再服用的药物丢弃

这种药物可能引起什么副作用?

虽然这种药物的副作用非常罕见, 但仍可能发生。这些副作用会在身体逐渐适应药物后消失。但如果副作用持续或引起不适, 请向医生查询。

药物	副作用
Prazosin (Minipress®) Terazosin (Hytrin®) Alfuzosin (Xatral®)	紧张 头晕 头痛 疲乏 胃部不适 排尿量增加

如果服药后有任何不寻常的副作用, 请向您的医生查询。

如果服药后出现以下症状, 请立即与医生联络:

- 呼吸困难
- 心跳不规律
- 心跳加速
- 心绞痛

请将所有药物存放在儿童不易触及的地方