

病人

须知

治疗药物

高血压

血管舒张药

Vasodilators



Medicine To Treat: Hypertension

血管舒张药是用来治疗什么疾病?

血管舒张药能使血管舒张,从而降低血压。

血管舒张药可能引起什么副作用?

这种药能导致心率加速、身体积水、脸红及头痛。

Hydralazine偶尔会导致皮疹、关节痛及发热。

我该采取什么防范措施?

初次服用这种药物,可能会导致血压过度降低。

常用的血管舒张药有那几种?

- Hydralazine

请把所有药物储存在儿童拿不到的地方

如何记得服药？

- 养成每天按时服药的习惯。

如果忘了服用一剂该怎么办？

- 如果忘了服用一剂，记起时立即服用。如果已接近下次服药时间，则只须照常服用一剂，不可连服两剂。

我该如何储存我的药物？

- 请遵照特别指示储存药物。
- 把药物储存在阴凉干燥之处。
- 把药物储存在原装容器里。不要把不同药物装在同一容器内。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院

新嘉坡中央医院
新嘉坡中央医院



Ministry Of Health



最后修订日期：2002年正月